

**RECOMENDACIONES AL PACIENTE QUE TOMA ACOD (Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban, Dabigatran)**

1. Debe tomar siempre la dosis establecida por el médico. No modifique nunca esta dosis por su cuenta. Si olvida un día tomarlo, no debe tomar el doble el día siguiente.
2. Tome la dosis siempre a la misma hora, con la comida o la cena.
3. Si toma:
  - **Dabigatran:** El ketoconazol por vía sistémica, la ciclosporina, el itraconazol, el tacrolimus y dronedarona están contraindicados.
  - **Rivaroxaban:** La administración conjunta con rifampicina, ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol o ritonavir esta contraindicada.
  - **Apixaban:** No se recomienda la administración conjunta con ketoconazol, itraconazol, voriconazol y posaconazol o ritonavir.
  - **Apixaban:** No se recomienda la administración conjunta con digoxina, amiodarona, eritromicina, ketoconazol, quinina y verapamilo dado que pueden alterar la exposición a edoxaban especialmente en pacientes con alteraciones moderadas de la función renal.

En todos los casos, debe administrarse con precaución en grupos de pacientes que reciben tratamiento concomitante con: antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), ácido acetilsalicílico u otros inhibidores de la agregación plaquetaria

3. No efectúe ejercicios violentos
4. Debe sospecharse sangrado ante cualquiera de estos síntomas:
  - Aparecer una mancha roja en la zona blanca del ojo.
  - Aparición de sangre, aunque sea mínima, en la nariz o en las encías.
  - Sabor a hierro (metálico)
  - Presencia de hematomas (cardinales, moratones, negrales).
  - Dolor de riñones u orinas oscuras, rosadas o rojas.
  - Heces negras o con presencia de sangre roja.

***Si algo de todo esto le ocurre, no se tome el anticoagulante y consulte con su médico.***

5. En caso de dolor de cabeza intenso o brusco, alteración de la visión o del habla, NO SE TOME EL ACOD, y acuda a Urgencias del Hospital.
6. En caso de necesitar una intervención quirúrgica, una extracción o limpieza dentaria, debe comunicárselo a su Unidad Básica Asistencial de Atención Primaria, y a su cirujano o dentista debe indicarle que está en tratamiento anticoagulante.

***Conserve siempre esta hoja entre sus documentos de identidad por que en caso de accidente será de gran utilidad para quienes lo atiendan.***