

INMUNIZACION DEL NIÑO MAL VACUNADO EN EXTREMADURA

Autores: Julián Bañez Gutiérrez y José Luis Domínguez Carlos


OBJETIVOS: 1.- Conseguir la correcta inmunización de todos los niños/as, independientemente de su edad, a través de la administración correcta, en tiempo y forma, de las dosis no administradas anteriormente.

2.- Facilitar la labor de los profesionales, sistematizando su actuación.

3.- Propiciar y aumentar la inmunidad colectiva.

NIÑO NO INMUNIZADO

1. Cualquier niño sin documento escrito de su vacunación.
2. Niño inmigrante con documento de vacunación, pero sus vacunas carecen de validez inmunológica: Países Africanos.
3. Niño inmigrante con documento de vacunación sin fiabilidad: Europa del Este, Rusia y China.



Bibliografía:

- Sociedad Extremeña de Pediatría de Atención Primaria. Revista Foro Pediátrico. Número 14, Enero 2004.
- Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Manual de Vacunas en Pediatría 2005.
- Navarro JA. Calendarios Vacunales retrasados o interrumpidos. Vacunaciones de Poblaciones Inmigrantes. En Salleras L. Vacunaciones Preventivas, Principios y Aplicaciones. Ed. Masson. Barcelona 2003.

CALENDARIO DEL NIÑO MAL VACUNADO 2006			
Intervalos de tiempo	EDAD DE INICIO		
	MEJOR DE 1 AÑO	DE 1 A 7 AÑOS	MAJOR DE 7 AÑOS
PRIMERA VISITA	-DTPa-Hib-VPI -Meningococo C -Hepatitis B	-DTPa (DTPaHib si < 5 años) -VPI (Polio Inactivada) -Triple Virica	-Tétanos-difteria (Td) -VPI -Triple Virica -Varicela (d)
AL MES	-Hepatitis B.	-Hepatitis B -DTPa -Meningococo C (a)	-Meningococo C -Hepatitis B. -Triple Virica
DOS MESES	-DTPa-Hib-VPI -Meningococo C	-DTPa (Hib en < 5 años si primera dosis en <15 meses) -Hepatitis B. -VPI	-Tétanos-difteria (Td) -VPI -HB
CUATRO MESES	-DTPa-Hib-VPI		
SEIS MESES	-Hepatitis B		
OCHO MESES		-DTPa -VPI -HB	-Td -VPI -HB
QUINCE MESES	-Triple Virica -Meningococo C Incorporación al Calendario Obligatorio		
CUATRO-SEIS AÑOS		-DTPa (b) -TV -VPI (c)	
CADA 10 AÑOS A PARTIR DE LA 3ª DOSIS DE TD		-Td	-Td

- (a) Meningococo C: En mayores de 1 año una sola dosis en todos los casos.
 (b) DTPa: se utilizará DTPa si es menor de 7 años en el momento de revacunación, si mayor de 7 años se utilizará Td.
 (c) VPI: Si se ha realizado primovacuna con Polio oral (VPO) y si la 3ª dosis se ha puesto siendo menor de 4 años.
 (d) No administrar si existe historia documentada de varicela o si es menor de 10 años. Dos dosis separadas entre 4 y 8 semanas, en niños de 13 ó más años. Una dosis para niños de 10, 11 y 12 años.

NIÑO PARCIALMENTE INMUNIZADO

- (1) Niño inmigrante con documento de vacunación fiable y ausencia de vacuna de meningitis C y varicela (América Latina).
- (2) Cualquier niño con una interrupción o retraso de la pauta vacunal, independientemente del calendario que siga.

ACTUACIÓN:

- No reiniciar la vacunación.
- Completar las dosis que faltan y seguir con su calendario.
- Conocer el nº mínimo de dosis necesarias para considerar correcta la vacunación.

VACUNAS	24 MESES	24 MESES-6 AÑOS	7-18 AÑOS
TRIPLE VIRICA	1	2	2
TETANOS DIFTERIA	4	4-5	3
TOSFERINA HAEMOPHILUS INFLUENZA E B	4	4-5	
POLIO	1-4 (1)	1	
HEPATITIS B	4	4	3
HEPATITIS B	3	3	3
HEPATITIS B	1-3 (2)	1	1

(1) Según la edad de comienzo de la vacunación: 7 meses: 4 dosis; 7-11 meses: 3 dosis; 12-14 meses: 2 dosis; >15 meses: 1 dosis

(2) Según la edad de comienzo de la vacunación: 6 meses: 3 dosis; 6-11 meses: 2 dosis; >1 año: 1 dosis.